

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ПроМериса Спот-Он для кошек при энтомозах
(организация-производитель Вайет-Ледерле Эс.пи.Эй., Италия (Wyeth-Lederle Italia S.p.A.)

І.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ПроМерис Спот-Он для кошек (ProMeris Spot-on for cats) – лекарственный препарат в форме раствора для наружного применения, предназначенный для лечения и профилактики энтомозов у кошек.

2. В своем составе ПроМерис Спот-Он для кошек в качестве действующего вещества содержит метафлумизон – 200 мг/мл, а в качестве вспомогательных веществ – синепроник NCA 830, диметилсульфоксид, гамма-гексолактон.

3. Препарат по внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета.

4. Выпускают препарат расфасованным по 0,8 мл и 1,6 мл в полимерные пипетки соответствующей вместимости, упакованные по 3 штуки в блистеры, помещенные в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

Каждую пипетку маркируют на русском языке с указанием: названия, объема препарата, номера серии и даты изготовления; каждую коробку – с указанием организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, назначения, способа применения и объема препарата в пипетке, числа пипеток в упаковке, названия и содержания действующего вещества, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, надписи «Для животных», номера государственной регистрации и информации о подтверждении соответствия.

Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 30°С.

Срок годности при соблюдении условий хранения 30 мес со дня изготовления.

ПроМерис Спот-он для кошек по истечении срока годности не должен применяться.

ІІ. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. ПроМерис Спот-он для кошек оказывает выраженное инсектицидное действие, активен в отношении личиночных и половозрелых фаз развития блох, паразитирующих на кошках. Механизм действия препарата заключается в способности метафлумизопа, связываясь с рецепторами клеток мышечной и нервной ткани паразитов, блокировать натриевые каналы мембран нервных клеток, что приводит к блокаде электрической активности нервных и мышечных клеток, нарушению двигательных рефлексов, параличу и гибели паразитов.

6. ПроМерис Спот-он для кошек по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражающего, резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия. Хорошо переносится кошками разных пород и возраста.

ІІІ. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. ПроМерис Спот-он для кошек применяют взрослым кошкам и котятam с 2-месячного возраста с целью лечения и профилактики энтомозов, вызванных *Stenocephalides canis* and *C. felis*, в том числе может использоваться в комплексном лечении аллергического дерматита (FAD).

8. Препарат применяют однократно путем капельного нанесения (spot-on) на сухую неповрежденную кожу животного. Перед использованием у пипетки отламывают кончик и, раздвинув шерсть, наносят препарат на кожу животного в места, недоступные для слизывания (в области шеи у основания черепа).

9. ПроМерис Спот-Он для кошек применяют в дозах с учетом массы животного (таблица). Рекомендованная минимальная доза составляет 40 мг метафлумизона на 1 кг массы животного.

Масса животного	Доза препарата (мл)
до 4	0,8
более 4	1,6

Продолжительность остаточного действия препарата против блох составляет 6–8 нед.

10. Повторные обработки кошек проводят по показаниям, не чаще 1 раза в месяц в течение всего сезона активности насекомых. В целях предотвращения повторной инвазии блохами кошкам заменяют подстилку или обрабатывают ее инсектицидным средством в соответствии с инструкцией по применению.

11. ПроМерис Спот-Он для кошек нельзя применять котятм младше 2-месячного возраста, беременным, кормящим, истощенным животным. Препарат нельзя наносить на поврежденную и влажную кожу. Не рекомендуется мыть животных в течение 4 сут после нанесения препарата.

12. Побочных явлений и осложнений при применении ПроМерис Спот-Он для кошек в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У отдельных животных с повышенной чувствительностью к метафлумизону возможно кратковременное усиление саливации, самопроизвольно исчезающее и не требующее применения лекарственных средств.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с ПроМерис Спот-Он для кошек следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

14. Во время работы с препаратом нельзя курить, пить и принимать пищу.

15. В случае попадания препарата на кожу его следует немедленно смыть водой с мылом. При попадании препарата в глаза – тщательно промыть их проточной водой.

16. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

17. Не следует подпускать кошек к детям в течение 24 ч после обработки животного и гладить места нанесения препарата.

18. Пустые пипетки из-под препарата утилизируют с бытовыми отходами.

19. ПроМерис Спот-он для кошек следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «Форт Додж Энимал Хелс» (Нидерланды)

Адрес организации производителя: «Wyelh-Lederle Italia S.p.A»; Catania Plant, Franco Gorgone-Zona Industriale, 95030 Catania, Italy.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВИ-2-6.8/02511.